

بروشور آموزش مصرف دارو قبل از ترخیص بیماریهای قلبی عروقی [نارسایی قلبی]

وارفارین



Warfarin (Coumadin)

موارد استفاده: داروی ضد انعقاد است که در بعضی از بیماریهای قلبی از جمله سکته قلبی و بیماریهای دریچه ای و بعضی از آریتمی های قلبی، بعد از آمبولی ریه

قبل از مصرف این دارو چه اطلاعاتی را باید به پزشک خود بگوییم؟

- ✓ در صورتی که باردار هستید بلافاصله دارو را قطع کنید چون منجر به صدمه شدید به جنین میشود.
- ✓ اگر به هر داروی خاصی یا غذا یا ماده دیگری حساسیت دارید در مورد آلرژی و علائمی که داشتید به پزشک خود بگویید.
- ✓ اگر در گذشته هر نوع بیماری شامل نارسایی کلیه یا اختلال عملکرد کبد و یا افزایش پتاسیم قبلا داشتید.
- ✓ در مورد مصرف هر دارو چه داروهای نسخه ای و چه داروهایی که بدون نسخه تهیه کردید به پزشک یا داروساز اطلاع دهید تا از نظر تداخلات احتمالی با داروی شما بررسی شود.
- ✓ هر گونه تغییر در دوز رو باید با اطلاع پزشک شما باشد.

بهترین روش مصرف دارو چیست؟

- ✓ دارو را به طور کامل قورت دهید و از جویدن و تکه کردن آن خودداری نمایید.
- ✓ دارو باید با معده خالی و یک ساعت قبل یا دو ساعت بعد غذا مصرف شود.

در صورت ایجاد چه عوارضی باید به پزشک اطلاع داد؟

- ✓ هر گونه علائم آلرژی به دارو مثل خارش قرمزی و کهیر و تورم صورت و تنگی نفس و درد دل ... را به پزشک خود اطلاع دهید.
- ✓ هر گونه تغییر در عملکرد کلیه را به صورت افزایش اوره و کراتینین به پزشک خود اطلاع دهید.

در صورت فراموشی مصرف دارو چه باید کرد؟

- ✓ به محض اینکه یک نوبت فراموش شده را به یاد آوردید دارو را مصرف کنید.
- ✓ اگر به زمان مصرف نوبت بعدی نزدیک است، نوبت فراموش شده را رها کرده و دوز بعدی را در زمان مصرف تعیین شده مصرف کنید.
- ✓ از مصرف دو دوز از دارو به صورت همزمان یا مصرف دوز اضافی اجتناب کنید.