

## اطلاعات دارویی بیماران قلبی بیمارستان افشار یزد

### آموزش قبل از ترخیص

### واحد توسعه تحقیقات بالینی



## کاپتوپریل

### (capoten) Captopril

**موارد استفاده:** مهار کننده سیستم رنین آنژیوتانسین و کنترل کننده پرفشاری خون در بیماران پرفشاری خون و نارسایی قلبی به کار گرفته میشود.

### قبل از مصرف این دارو چه اطلاعاتی را باید به پزشک خود بگوییم؟

- قبل از مصرف این دارو چه اطلاعاتی را باید به پزشک خود بگوییم؟
- اگر به هر داروی خاصی یا غذا یا ماده دیگری حساسیت دارید در مورد آلرژی و علائمی که داشتید به پزشک خود بگویید.
- اگر در گذشته هر گونه علائمی از تورم دست، پا، صورت، لب ها، چشم ها، زبان یا گلو داشتید.
- اگر در گذشته مشکلات تنفسی، مشکل در بلع یا گرفتگی صدا به صورت غیر معمول داشتید.
- مصرف این دارو در زنان باردار یا زنانی که قصد بارداری دارند جایز نیست و حتما در صورت بارداری به پزشک خود اطلاع دهید.
- در مورد مصرف هر دارو چه داروهای نسخه ای و چه داروهایی که بدون نسخه تهیه کردید به پزشک یا داروساز اطلاع دهید تا از نظر تداخلات احتمالی با داروی شما بررسی شود.

### بهترین روش مصرف دارو چیست؟

- دارو را به طور کامل قورت دهید و از جویدن و تکه کردن آن خودداری نمایید.
- دارو باید با معده خالی و یک ساعت قبل یا دو ساعت بعد غذا مصرف شود.

### در صورت ایجاد چه عوارضی باید به پزشک اطلاع داد؟

- هر گونه علائمی از تورم دست، پا، صورت، لب ها، چشم ها، زبان یا گلو
- مشکلات تنفسی، مشکل در بلع یا گرفتگی صدا
- مشکلات در دفع ادرار یا وجود خون در ادرار
- سرفه های خشک ادامه دار

### در صورت فراموشی مصرف دارو چه باید کرد؟

- به محض اینکه یک نوبت فراموش شده را به یاد آوردید دارو را مصرف کنید.
- اگر به زمان مصرف نوبت بعدی نزدیک است، نوبت فراموش شده را رها کرده و دوز بعدی را در زمان مصرف تعیین شده مصرف کنید.
- از مصرف دو دوز از دارو به صورت همزمان یا مصرف دوز اضافی اجتناب کنید.